

L-システイン製剤

アルケシクール®

ALKESHI-COOL

アルケシクールは、肝臓でのアルコール代謝をたすけ、つらい二日酔いやカラダのだるさを治療する、L-システインを配合した医薬品です。

★肝臓でのアルコール代謝を早め、二日酔いを治療します。

L-システインが、アルコールを分解代謝する酵素（アルコール脱水素酵素、アセトアルデヒド脱水素酵素）を活性化し、肝臓でのアルコール代謝を早め、つらい症状を治療していきます。

★二日酔いの原因物質（アセトアルデヒド）に直接はたらき症状を改善します。

L-システインは、酵素による反応以外にも、アルコールの代謝物で二日酔いの原因物質ともいわれているアセトアルデヒドと直接反応し代謝することで、アセトアルデヒドを解毒し、二日酔いのつらい症状を改善します。

★二日酔いなどからくるカラダのだるさにも効果を発揮します。

エネルギー産生に関与することで、カラダのだるさ（全身倦怠）に対しても効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹
消化器	悪心・嘔吐、腹痛

(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

効能・効果

- 二日酔
- 全身倦怠
- しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着症
- 湿疹、じんましん、かぶれ、にきび、くすりまけ


用法・用量

次の1回量を1日3回服用します。

年齢	成人(15才以上)	7才~14才	7才未満
1回量	2錠	1錠	服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)食前・食後、いずれの服用でもかまいません。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4)錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



成分 6錠(成人1日量)中

L-システイン240mg
アスコルビン酸(ビタミンC)300mg
パントテン酸カルシウム24mg
添加物として、無水ケイ酸、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、部分アルファードンブ、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有します。

●本剤の服用により、尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

