

궁금한 점이나 불편한 사항이 있으시면 약사와 상담하십시오.

체크 ① [다음 사항에 모두 해당합니까?]

- ☐ 만족스러운 성행위를 하기에 충분한 강도의 발기가 되지 않거나 발기가 유지되지 않는다
- ☐ 성인 남성(18세 이상)이다

아니오

1개라도
'아니오'가 있는 분은
이 약을
복용할 수 없습니다.

예

체크 ② [다음 중 어느 하나라도 해당합니까?]

- ☐ 본 약 또는 본 약의 성분으로 인해 알레르기 증상이 발생한 적이 있다
- ☐ 협심증 등의 심장 질환에 자주 사용되는 니트로글리세린(미리스를 등), 이소소르비드 이질산염(니트룰, 후란도르 등), 니코란딜(시그마트 등) 등의 질산제 등을 사용 중이다
- ☐ 아질산 아밀(오락용 약물인 '포퍼' 등 포함) 등을 사용 중이다
- ☐ 리오시구아트(아덱파스 등), 케토코나졸(경구제, 일본 국내 미발매), 이트라코나졸(이트리졸 등), 클래리스로마이신(클래리스, 클라리시드 등)을 사용 중이다

예

1개라도
'예'가 있는 분은
이 약을
복용할 수 없습니다.

이 약으로 치료할 수 없으므로 다른 치료법에 대해 의사와 상담하십시오.

아니오

체크 ③ [다음 중 어느 하나라도 해당합니까?]

- ☐ 심혈관 계에 장애 등이 있어 성행위가 부적절하다고 판단된다
- ☐ 3개월 이내에 심근경색을 일으킨 적이 있다
- ☐ 불안정 협심증이 있거나 성행위 중에 협심증이 발생한 적이 있다
- ☐ 6개월 이내에 뇌경색·뇌출혈을 일으킨 적이 있다
- ☐ 약을 복용해도 불규칙한 맥박이 조절되지 않는다
- ☐ 의사로부터 간 관련 이상을 지적받은 적이 있다
- ☐ 저혈압이다(혈압 < 90/50mmHg)
- ☐ 의사로부터 신장 관련 이상을 지적받은 적이 있다
- ☐ 혈압강화제를 복용해도 혈압이 높다(안정 시 혈압 > 170/100mmHg)
- ☐ 다음 진단을 받은 사람
· 망막색소변성증

예

1개라도
'예'가 있는 분은
이 약을
복용할 수 없습니다.

성행위는 심장에 리스크를 동반합니다. 심장·혈관계 장애의 의심 증상이 있는 사람은 반드시 사전에 의사에게 확인하십시오. 심근경색 등을 일으킬 우려가 있습니다. 또한 간에 심한 장애가 있는 사람, 신장에 중간 정도~심한 장애가 있는 사람, 망막색소변성증 진단을 받은 사람도 이 약을 복용할 수 없습니다. 다른 치료법에 대해 의사와 상담하십시오.

아니오

체크 ④ [다음 중 어느 하나라도 해당합니까?]

- ☐ 의사의 치료 또는 의사로부터 투약을 받고 있다
- ☐ 약 등으로 인해 알레르기 증상이 발생한 적이 있다
- ☐ 다음 약제를 복용 중이다
· 전립선 비대증 치료제 또는 혈압강화제(α차단제(독사조신 등), 알로딘 등)
· 항HIV 약제(리토나비르, 사퀴나비르 등)
· 항균제(리팜피신 등)
· 항뇌전증약(페니토인, 페노바르비탈 등)
- ☐ 다음 진단을 받은 사람
· 지속발기증(4시간 이상 발기가 지속된 적이 있다)
· 혈액 질환(경상 적혈구성 빈혈, 다발성 골수종, 백혈병 등)
· 출혈성 질환, 소화성 궤양
· 음경 변형(굴곡, 음경 섬유화, 페이로니병 등)
- ☐ 고령이다(65세 이상)
· 신장 기능에 관한 검사를 받은 적이 없다.
· 최근 검사에서 신장 기능 저하를 지적받았다(Ccr[크레아티닌 청소율]이 50mL/min 이하)
- ☐ 다른 발기부전 치료를 받고 있다
- ☐ 가벼운 운동이나 중간 정도 운동(예: 20분 정도 빠른 걸음으로 걷기, 계단 1개 층을 빠른 걸음으로 뛰어오르기 등)으로 심하게 숨이 차거나 가슴에 통증을 느낀다

예

1개라도
'예'가 있는 분은
이 약을 복용하지
못할 수도 있으므로
의사 또는 약사에게
상담하십시오.

의료기관에 방문하실 때는
본 약 복용에 대해 상담하십시오.

상담 후,
복용이 가능한 경우

아니오

본 약을 복용할 때는 다음 내용을 준수할 것을 약사와 함께 확인하시기 바랍니다.

확인했다면 ☒ 체크해 주십시오.

- ☐ 자몽 주스 등은 이 약에 영향을 미칠 수 있으므로 삼가하십시오.
- ☐ 4~8회 복용해도 효과가 나타나지 않는 경우는 의사 또는 약사와 상담하십시오.
(발기부전은 심장 질환, 고혈압, 당뇨병 등의 질환과 관련이 있을 수 있으므로, 초기에 의사 또는 약사와 상담하십시오)
- ☐ 본 약 복용 후 협심증 등의 증상이 나타나 의료기관에 방문할 경우, 본 약을 복용하고 있다는 사실을 반드시 의사 또는 약사에게 알려십시오.
- ☐ 복용 후에는 높은 곳에서의 작업, 차량 또는 기계류의 운전·조작에 주의하십시오(어지러움이나 시야 흐려짐 등의 증상이 나타날 수 있습니다)

확인했습니다

약사에게 설명을 듣고, 사용자용 정보 제공 자료를 잘 읽어보신 후 구매하십시오.
또한, 구매 후에도 첨부된 문서의 내용을 잘 확인하신 후 사용하십시오.
의료기관의 안내 등 도움이 필요하시면 약사와 상담하십시오.

