

如有不明之處或任何問題，請諮詢藥劑師。

檢測①【是否符合下列所有項目？】

☐ 勃起硬度不足或無法維持勃起，不能進行滿意的性行為

☐ 成年男性（18 歲以上）

否

只要有任一項選擇
「否」，
將無法服用本藥品。

是

檢測②【是否符合下列任一項？】

☐ 曾因本藥品或本藥品的成分引發過敏症狀

☐ 目前正在服用心絞痛等心臟病常用的硝化甘油（敏立舒等）、5-單硝酸異山梨醇酯（寧托樂、福朗得等）、Nicorandil（喜革脈等）等硝酸劑等藥物

☐ 目前正在服用亞硝酸異戊酯（包含娛樂性藥物波普等）等藥物

☐ 目前正在服用 Riociguat（愛定保肺等）、酮康唑（口服劑，日本國內未上市）、伊曲康唑（Itrazole 等）、克拉黴素（克羅利黴素、開羅理黴素等）

是

只要有任一項選擇
「是」，
將無法服用本藥品。

本藥品並無治療功效，關於其他治療方法，請諮詢醫師。

否

檢測③【是否符合下列任一項？】

☐ 有心血管障礙等，不適合從事性行為

☐ 有不穩定型心絞痛或曾在性行為時發生心絞痛

☐ 服用藥物仍無法改善心律不整

☐ 有低血壓（血壓 < 90/50mmHg）

☐ 即使服用了降血壓藥，血壓仍然很高（休息時血壓 > 170/100mmHg）

☐ 3 個月以內曾發生心肌梗塞

☐ 6 個月以內曾發生腦梗、腦溢血

☐ 曾受醫師指出肝臟相關異常

☐ 曾受醫師指出腎臟相關異常

☐ 確診下列疾病者
• 視網膜色素變性

是

只要有任一項選擇
「是」，
將無法服用本藥品。

性行為伴隨著心臟風險。疑有心臟、血管障礙的人，請務必提前向醫師確認。恐有引發心肌梗塞等的危險。此外，有重度肝功能障礙、中度~重度腎功能障礙、確診為視網膜色素變性的人，亦不可服用本藥品。關於其他治療方法，請諮詢醫師。

否

檢測④【是否符合下列任一項？】

☐ 目前正在接受醫師的治療、服用醫師開的處方藥

☐ 目前正在服用下列藥物
• 攝護腺肥大治療藥或降血壓藥（α受體阻滯劑（甲磺酸多沙唑嗪等）、脈優等）
• 抗反轉錄病毒藥物（利托那韋、沙奎那韋等）
• 抗菌藥（立汎黴素等）
• 抗癲癇藥（苯妥英、苯巴比妥等）

☐ 高齡（65 歲以上）
• 不曾做過腎功能相關檢查
• 最近檢查時，醫師指出腎功能降低（Ccr [肌酸酐廓清率] 50mL/min 以下）

☐ 曾因藥品等引發過敏症狀

☐ 確診下列疾病者
• 陰莖異常勃起（曾持續勃起 4 小時以上）
• 血液疾病（鎌狀細胞貧血症、多發性骨髓瘤、白血病等）
• 出血性疾病、消化性潰瘍
• 陰莖變形（屈曲、陰莖纖維化、佩羅尼氏病等）

☐ 目前正在接受其他勃起障礙治療

☐ 輕度或中度運動（例如快走約 20 分鐘、1 階 1 階快跑上樓梯等）會造成嚴重地喘不過氣或感到胸口疼痛

是

只要有任一項選擇
「是」，
或許無法服用本藥品，
請諮詢醫師或藥劑師。

在醫療機構接受診療時，
請諮詢可否服用本藥品。

如在諮詢後
確定可服用本藥品

否

服用本藥品之際，請與藥劑師一起確認下列內容並遵守之。

請在確認後 ☒ 打勾。

☐ 葡萄柚汁等將對本藥品造成影響，請勿攝取。

☐ 如在服用 4~8 次後仍未出現效果，請諮詢醫師或藥劑師。
(勃起障礙有可能與心臟病、高血壓、糖尿病等疾病有關，因此請盡早諮詢醫師或藥劑師)

☐ 如在服用本藥品後出現心絞痛等症狀，並且前往醫療機構接受診療時，請務必告知醫師或藥劑師，您正在服用本藥品。

☐ 服用本藥品後，在高處作業、駕駛或進行機械類的運轉操作時，敬請小心（有可能發生暈眩、視線模糊等症狀）。

已確認

請仔細聽完藥劑師說明，並詳閱使用者服用須知。
此外，購買後也請詳閱藥品仿單的內容再服用。
如需介紹醫療機構等任何協助，請諮詢藥劑師。

