

Cialis®

지도 필요 의약품

【발기부전 치료제】

판매명: 시알리스®

- 본 약제는 발기부전을 겪는 남성을 위한 치료제입니다. 발기부전이란, 남성이 만족스러운 성행위를 하기에 충분한 만큼 단단한 발기를 얻지 못하거나, 혹은 그 상태를 유지하지 못하는 증상을 말합니다.
- 유효 성분인 타다라필이 음경의 혈관을 이완시켜, 음경으로 향하는 혈류량을 증대시킵니다.
- 단순히 본 약제를 복용하는 것만으로는 발기가 일어나지 않습니다. 성적인 자극이 주어졌을 때에만 발기가 이루어집니다. 그 효과는 복용 후 약 30 분이 지난 시점부터 나타나기 시작하여, 최대 복용 후 36 시간까지 지속되는 것으로 확인되었습니다.
- 식전과 식후에 관계없이 복용할 수 있습니다.
- 본 약제는 성병을 예방하는 효과는 지니지 않습니다.



사용상의 주의사항



금지 사항

(이를 지키지 않을 경우 현재의 증상이 악화되거나, 부작용 및 사고가 발생할 위험이 커집니다.)

① 다음의 사람들은 복용을 금합니다

- (1) 본 약제 혹은 본 약제의 성분으로 인해 알레르기 증상을 겪은 적이 있는 자.
- (2) 협심증 등 심장병에 자주 쓰이는 니트로그리세린(미리시롤 등), 아질산아밀, 질산이소소르비드(니트롤, 프란돌 등), 니코란딜(시그마트 등)과 같은 질산염 제제 등을 사용 중인 자. (사용 중인 약물을 반드시 확인해 주세요)
- (3) 리오시구앗(아템파스 등), 케토코나졸(경구제, 국내 미발매), 이트라코나졸(이트리졸 등), 클라리트로마이신(클라리스, 클라리시드 등)을 사용 중인 자. (사용 중인 약물을 반드시 확인해 주세요)
- (4) 심혈관계에 장애가 있는 등, 성행위가 부적절하다고 여겨지는 자.
- (5) 불안정 협심증을 앓고 있거나, 성행위 도중 협심증을 일으킨 적이 있는 자.
- (6) 약을 복용해도 맥박의 불규칙함을 억제하지 못하는 자, 저혈압 환자(혈압 < 90/50 mmHg), 또는 혈압 강하제를 복용해도 혈압이 높은 자(안정 시 혈압 > 170/100 mmHg).
- (7) 최근 3 개월 이내에 심근경색을 일으킨 적이 있는 자.
- (8) 최근 6 개월 이내에 뇌경색이나 뇌출혈을 일으킨 적이 있는 자.
- (9) 의사로부터 간에 이상이 있다는 지적을 받은 자.
- (10) 의사로부터 신장에 이상이 있다는 지적을 받은 자.
- (11) 다음의 진단을 받은 자. 망막색소변성증
- (12) 여성.

(성행위는 심장에 위험을 동반합니다. 심장이나 혈관계 장애가 의심되는 이는 반드시 사전에 의사에게 확인을 구해야 합니다. 심근경색 등을 유발할 우려가 있습니다.)

② 자몽 주스 등은 이 약에 영향을 미치므로 복용하지 마십시오



상담할 사항

① 다음과 같은 환자는 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의해야 합니다

- (1) 의사의 치료를 받거나 의사로부터 투약을 받고 있는 자, 혹은 다음의 약물을 복용 중인 자. 전립선 비대증 치료제나 혈압 강하제(알파 차단제(독사조신 등), 암로디핀 등), 항 HIV 약물(리토나비르, 사퀴나비르 등), 항균제(리팜피신 등), 항간질약(페니토인, 페노바르비탈 등)
- (2) 고령자.
- (3) 약물 등으로 인해 알레르기 증상을 겪은 적이 있는 자.
- (4) 다음의 진단을 받은 자. 지속발기증(4 시간 이상 발기가 이어진 적이 있음), 혈액 질환(경상 적혈구 빈혈, 다발성 골수종, 백혈병 등), 출혈성 질환, 소화성 궤양, 음경의 변형(굴곡, 음경의 섬유화, 페이로니병 등)
- (5) 다른 발기부전 치료를 병행하고 있는 자.
- (6) 가벼운 운동이나 중강도의 운동(예를 들면 20 분 정도 빠른 걸음으로 걷거나, 계단을 1 층 정도 빠른 걸음으로 오르는 등)에도 극심하게 숨이 가쁘거나 가슴에 통증을 느끼는 자.

② 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중단하고 이 설명서를 지참하여 의사나 약사와 상의해야 합니다

관계 부위	증상
피부	발진 및 발적, 가려움, 다한증, 손발톱 주위의 염증
소화기	구역질 및 구토, 소화불량, 속쓰림, 설사, 입 마름, 위염, 복통, 위 불쾌감, 변비, 복부 팽만, 묽은 변, 삼키기 어려움, 신물이 올라옴
정신신경계	두통, 어지러움, 수면 장애, 찌릿찌릿한 느낌, 졸음, 불안, 편두통, 감각 둔화
감각기	시야 흐림, 눈의 통증, 눈물, 눈의 이상 감각, 충혈, 눈곱, 이명, 시각 장애, 눈꺼풀 부종
순환기	두근거림, 화끈거림, 흉통, 맥박 빨라짐, 실신, 고혈압, 저혈압, 식은땀, 의식 저하, 편측 팔다리 운동 저하, 발음 어려움

(앞면에서 이어짐)

관계 부위	증상
호흡기	호흡 곤란, 코막힘, 비염, 기침을 동반한 객혈, 코피, 인후 부종
비뇨기	배뇨 곤란, 발기 증가, 비정상적인 발기 및 그 지속
기타	피로, 권태감, 열감, 부종, 점막 부종, 동통, 등 통증, 근육통, 관절통, 목 통증, 엉덩이 통증, 근육 경련, 근골격 경직, 체중 증가

다음과 같은 중증 증상이 일어나는 경우가 있습니다. 그럴 경우 즉시 의사의 진료를 받아야 합니다.

증상의 명칭	증상
과민증	발진, 두드러기, 안면 부종
박탈성 피부염	거의 전신의 피부가 붉어지고 비듬이나 딱지 같은 것이 들려붙어 떨어져 나가며, 종종 발열을 동반한다
피부점막안증후군 (스티븐스-존슨 증후군)	고열, 눈의 충혈, 눈곱, 입술 혈음, 인후통, 피부의 광범위한 발진 및 발적 등이 지속되거나 급격히 악화된다

- ③ 복용 후, 갑자기 시력이 떨어지거나 눈이 보이지 않게 되는 증상이 나타날 경우에는 복용을 중단하고 즉시 안과 진료를 받아야 합니다
- ④ 복용 후, 발기가 4 시간 이상 지속될 가능성이 있습니다. 6 시간 이상 발기가 이어질 경우, 처치가 늦어지면 발기 기능을 상실할 수도 있습니다. 발기가 4 시간 이상 지속된다면 즉시 의사의 진료를 받아야 합니다
- ⑤ 4~8 회 복용하여도 효과를 보지 못할 경우에는 이 설명서를 지참하여 의사나 약사와 상의해야 합니다.
(발기부전은 심장병, 고혈압, 당뇨병 등의 질환과 연관되어 있을 수 있으므로 조속히 의사나 약사와 상의해야 합니다.)
- ⑥ 복용 후에는 높은 곳에서의 작업이나 차량, 기계류의 운전 조작에 주의를 기울여 주세요. (어지러움이나 시야 흐림 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)

효능 및 효과

발기부전

(만족스러운 성행위를 하기에 충분한 발기와 그 유지가 불가능한 자)

〈효능 및 효과와 관련된 주의사항〉


(1) 본 약제는 최음제나 성욕 증진제가 아닙니다. (2) 본 약제는 성병을 예방하는 효과는 지니지 않습니다. (3) 본 약제를 복용하는 것만으로는 발기가 일어나지 않으며, 성적인 자극이 주어졌을 때에만 발기가 이루어집니다. 그 효과는 복용 후 약 30 분이 지난 시점부터 나타나기 시작하여, 최대 복용 후 36 시간까지 지속됩니다.

용법 및 용량

성인 남성(18 세 이상)은 1 회 1 정을 성행위 약 1 시간 전에 물이나 미지근한 물과 함께 복용합니다. 1 일 1 정을 초과하여 복용하지 마십시오. 또한 복용 간격은 24 시간 이후부터 가능합니다.

〈용법 및 용량과 관련된 주의〉

- (1) 용법과 용량을 준수해 주세요.
- (2) 식전과 식후에 관계없이 복용할 수 있습니다.
- (3) 과도한 음주 시에는 본 약제의 복용을 삼가야 합니다.
- (4) 매일 연속하여 복용하는 것은 권장하지 않습니다. 연일 복용할 경우에는 의사와 상의해야 합니다.
- (5) 정제를 꺼내는 법: 오른쪽 그림과 같이 정제가 들어있는 PTP 시트의 불록한 부분을 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 찢은 뒤 꺼내어 복용합니다. 실수로 그대로 삼킬 경우 식도 점막에 찢리는 등 예기치 못한 사고로 이어질 수 있습니다.)



성분

타다라필 10 mg

1 정 중

첨가물: 크로스카멜로오스나트륨, 셀룰로오스, 유당, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스, 스테아르산마그네슘, 탈크, 산화티탄, 삼산화철, 트리아세틴, 라우릴황산나트륨

보관 및 취급상의 주의

- (1) 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관해야 합니다.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
- (3) 다른 용기에 바꿔 담지 말아야 합니다. (오용의 원인이 되거나 품질이 변질될 수 있습니다.)
- (4) 사용 기한이 지난 것은 복용하지 말아야 합니다.



문의처

구입한 상점 혹은 고객센터로 문의해 주세요.

에스에스제약 주식회사 고객센터 전화 0120-028-193 접수시간: 9시부터 17 시까지 (토, 일, 공휴일 제외)

제조판매원



에스에스제약 주식회사

(우) 163-1444 도쿄도 신주쿠구 니시신주쿠 3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>