



이브 쓰리샷 프리미엄

제②류 의약품

【해열 진통제】

- 이브 쓰리샷 프리미엄은 두통, 생리통, 어깨결림통에 효과를 보도록 설계된 제제입니다.

《특장점》

- 이부프로펜과 아세트아미노펜의 더블 진통 성분을 배합하였습니다.
- 이부프로펜의 빠른 용출을 실현한 독자 기술 쿼크 액션 정제를 채용하였습니다.
- 위를 보호하는 산화마그네슘(위점막 보호 성분)을 배합하고 졸음이 오는 성분은 제외하였습니다.

⚠ 사용상의 주의사항



금지 사항

(이를 지키지 않을 경우 현재의 증상이 악화되거나, 부작용 및 사고가 발생할 위험이 커집니다.)

① 다음의 환자들은 복용하지 마십시오

- (1) 본 약제 혹은 본 약제의 성분으로 인해 알레르기 증상을 겪은 적이 있는 환자.
- (2) 본 약제 또는 다른 해열 진통제, 감기약을 복용하여 천식을 일으킨 적이 있는 환자.
- (3) 15 세 미만의 소아.
- (4) 출산 예정일 12 주 이내의 임산부.

② 본 약제를 복용하는 동안에는 다음의 의약품을 복용하지 마십시오

다른 해열 진통제, 감기약, 진정제

③ 복용 전후에 음주하지 마십시오

④ 장기로 연속 복용하지 마십시오



상담할 사항

① 다음에 해당하는 환자는 복용 전에 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

- (1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 환자.
- (2) 임산부 또는 임신 중이라고 생각되는 환자. (3) 수유 중인 환자.
- (4) 고령자. (5) 약물 등으로 인해 알레르기 증상을 겪은 적이 있는 환자.
- (6) 다음의 진단을 받은 환자. 심장병, 신장병, 간장병, 전신성 홍반성 낭창, 혼합성 결합 조직 질환
- (7) 다음 병에 걸린 적이 있는 자. 위·십이지장 궤양, 궤양성 대장염, 크론병

② 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중단하고 이 설명서를 지참하여 의사, 치과의사, 약사 또는 등록 판매자와 상의해야 합니다

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움, 푸른 멍
소화기	메스꺼움·구토, 식욕 부진, 위부 불쾌감, 위통, 구내염, 속쓰림, 더부룩함, 위장 출혈, 복통, 설사, 혈변
정신신경계	현기증
순환기	두근거림
호흡기	숨이 참
기타	눈 침침함, 이명, 부종, 코피, 잇몸 출혈, 출혈이 멈추지 않는 증상, 출혈, 등 통증, 과도한 체온 저하, 나른함

드물게 아래와 같은 심각한 증상이 일어나는 경우가 있습니다. 이러한 경우 즉시 의사에게 진료를 받아야 합니다.

증상의 명칭	증상
쇼크 (아나필락시스 쇼크)	복용 후 즉시 피부 가려움, 두드러기, 목쉼소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.
피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피괴사용해증, 급성 범발성 발진성 농포증	고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후통, 피부 광범위한 발진·발적, 붉어진 피부 위에 작은 좁쌀(작은 농포)이 생김, 전신이 나른함, 식욕이 없음 등이 지속되거나 급격히 악화됨.
약제성 과민증	피부가 넓은 범위로 붉어짐, 전신성 발진, 발열, 몸이 나른함, 림프절(목, 겨드랑이, 사타구니 등) 부음 등이 나타남.

(뒷면으로 이어짐)

(앞면에서 이어짐)

증상의 명칭	증상
간기능 장애	발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.
신장 장애	발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통(마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다.
무균성 뇌수막염	목덜미가 당기는 심한 두통, 발열, 메스꺼움·구토 등이 나타난다. (이러한 증상은 특히 전신성 홍반성 낭창 또는 혼합성 결핵 조직 질환의 치료를 받고 있는 환자에게서 많이 보고되고 있다.)
심근경색	죄어드는 듯한 가슴 통증, 호흡 곤란, 식은땀이 난다.
뇌혈관 장애	의식 저하·소실, 한쪽 팔다리가 움직이기 어려워짐, 두통, 구토, 현기증, 말하기 어려워짐, 말이 잘 나오지 않는 현상 등이 갑자기 나타난다.
간질성 폐렴	계단을 오르거나, 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.
천식	숨을 쉴 때 색색, 휘휘와 같은 소리가 나며, 호흡 곤란 등의 증상을 보인다.
재생 불량성 빈혈	푸른 명, 코피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보임, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 속이 안 좋아지며 어질해짐, 혈뇨 등이 나타난다.
무과립구증	갑작스러운 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다.

- ③ 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 악화하는 경우 복용을 중단하고 이 설명서를 지참하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
 변비
- ④ 3~4 회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 설명서를 지참하여 의사, 치과 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

효능 및 효과

● 두통·월경통(생리통)·어깨결림통·치통·인후통·관절통·근육통·신경통·요통·발치 후 동통·타박통·이통·골절통·염좌에 따르는 통증(염좌통)·외상통의 진통

용법 및 용량

● 오한(발열로 인한 한기)·발열 시의 해열

다음 1 회 용량을 최대 1 일 2 회, 가급적 공복을 피해 물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오. 복용 간격은 6 시간 이상 띄워 주십시오.

연령	성인(15 세 이상)	15 세 미만
1 회 용량	3 정	×복용하지 말 것

<용법 및 용량과 관련된 주의>

- (1) 용법과 용량을 준수해 주십시오.
- (2) 정제를 꺼내는 법: 오른쪽 그림과 같이 정제가 들어있는 PTP 시트의 볼록한 부분을 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 호일을 찢은 뒤 꺼내어 복용합니다.
 (실수로 그대로 삼킬 경우 식도 점막에 찢리는 등 예기치 못한 사고로 이어질 수 있습니다.)



성분

3 정 중

이부프로펜 195mg 아세트아미노펜 195mg
 산화마그네슘 70mg 무수카페인 65mg

첨가물: 무수구산, 셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스, 마크로골, 스테아린산마그네슘, 탈크, 산화티탄

보관 및 취급상의 주의

- (1) 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관해야 합니다.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
- (3) 다른 용기에 바꿔 담지 말아야 합니다. (오용의 원인이 되거나 품질이 변질될 수 있습니다.)
- (4) 사용 기한이 지난 것은 복용하지 말아야 합니다.

문의처

구입한 상점 혹은 고객센터로 문의해 주십시오.
 에스에스제약 주식회사 고객센터 전화 0120-028-193
 접수시간: 9시부터 17시 30분까지(토, 일, 공휴일 제외)

제조판매원



에스에스제약 주식회사

(우) 163-1488 도쿄도 신주쿠구 니시신주쿠 3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>