




■イブシリーズ 成分比較表

製品名	イブクイック頭痛薬DX			イブクイック頭痛薬		
カテゴリ(薬効)	解熱鎮痛薬			解熱鎮痛薬		
分類	第②類医薬品			第②類医薬品		
パッケージ	<p>つらい頭痛に速攻！</p> 			<p>頭痛に速攻！</p> 		
剤形	錠剤			錠剤		
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> 頭痛・肩こり痛・歯痛・月経痛(生理痛)・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 悪寒・発熱時の解熱 			<ul style="list-style-type: none"> 頭痛・肩こり痛・歯痛・月経痛(生理痛)・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 悪寒・発熱時の解熱 		
用法・用量	次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさせて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。					
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	2錠	×服用しないこと	1回量	2錠	×服用しないこと
成分	成分 2錠中			成分 2錠中		
	イブプロフェン	200mg		イブプロフェン	150mg	
	酸化マグネシウム	100mg		酸化マグネシウム	100mg	
	アリルイソプロピルアセチル尿素	60mg		アリルイソプロピルアセチル尿素	60mg	
	無水カフェイン	80mg		無水カフェイン	80mg	
	添加物:無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン			添加物:無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン		

製品名	イブA錠			イブA錠EX		
カテゴリ(薬効)	解熱鎮痛薬			解熱鎮痛薬		
分類	第②類医薬品			第②類医薬品		
パッケージ	<p>いつもの生理痛・頭痛に</p> 			<p>生理2日目の痛みにも</p> 		
剤形	錠剤			錠剤		
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> 月経痛(生理痛)・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 悪寒・発熱時の解熱 			<ul style="list-style-type: none"> 月経痛(生理痛)・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 悪寒・発熱時の解熱 		
用法・用量	次の1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさせて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。					
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	2錠	×服用しないこと	1回量	2錠	×服用しないこと
成分	成分 2錠中			成分 2錠中		
	イブプロフェン	150mg		イブプロフェン	200mg	
	アリルイソプロピルアセチル尿素	60mg		アリルイソプロピルアセチル尿素	60mg	
	無水カフェイン	80mg		無水カフェイン	80mg	
		添加物:クロスカルメロースNa、無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン			添加物:無水ケイ酸、セルロース、クロスカルメロースNa、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン	

製品名	イブ		イブメルト			
カテゴリ(薬効)	解熱鎮痛薬		解熱鎮痛薬			
分類	第②類医薬品		第②類医薬品			
パッケージ	<p>痛み・熱に効く 飲みやすい小粒の錠剤。</p> 		<p>水なしで飲めて効く！</p> 			
剤形	錠剤		錠剤			
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ・月経痛(生理痛)・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 ・悪寒・発熱時の解熱 		<ul style="list-style-type: none"> ・頭痛・月経痛(生理痛)・腰痛・肩こり痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・筋肉痛・関節痛・神経痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 ・悪寒・発熱時の解熱 			
用法・用量	次の1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。					
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	2錠	×服用しないこと	1回量	1錠	×服用しないこと
成分	成分 2錠中		成分 2錠中			
	イブプロフェン	150mg	イブプロフェン	200mg		
	添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン		添加物:無水ケイ酸、セルロース、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ステアリン酸Mg、タルク、トウモロコシデンプン、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート80、クエン酸トリエチル、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、アセスルファムカリウム、DL-リンゴ酸、香料			