

■ガストールシリーズ 成分比較表

製品名	ガストール錠		ガストール細粒		ガストールアクティブ	
カテゴリ(薬効)	胃腸薬		胃腸薬		胃腸薬	
分類	第2類医薬品		第2類医薬品		第3類医薬品	
パッケージ	つらい胃痛や胃酸逆流などによる胸やけに、出過ぎる胃酸を抑え、胃を保護する。 M₁ブロッカー配合の胃腸薬。 		つらい胃痛や胃酸逆流などによる胸やけに、出過ぎる胃酸を抑え、胃を保護する。 M₁ブロッカー配合の胃腸薬。 		胃もたれ・消化不良に。胃粘膜を修復し、胃の働きを助ける。 	
剤形	錠剤		細粒		顆粒	
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ 胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感 はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ 食べ過ぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振 		<ul style="list-style-type: none"> 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ 胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感 はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ 食べ過ぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振 		胃もたれ、食欲不振、消化不良、胃弱、胃部・腹部膨満感、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐	
用法・用量	次の1回量を1日3回、毎食後に水又はぬるま湯で服用してください。		次の1回量を1日3回、毎食後に水又はぬるま湯で服用してください。		次の1回量を1日3回、食前又は食後に服用してください。	
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	3錠	×服用しないこと	1回量	1包	×服用しないこと
成分	成分 9錠(成人1日量)中		成分 3包(成人1日量)中		成分 3包(成人1日量)中	
	ピレンゼピン塩酸塩水和物<M ₁ ブロッカー>(ピレンゼピン塩酸塩無水物として45mg)	47.1mg	ピレンゼピン塩酸塩水和物<M ₁ ブロッカー>(ピレンゼピン塩酸塩無水物として45mg)	47.1mg	ケイヒ乾燥エキス(ケイヒ 1,100mgに相当)	50mg
	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	900mg	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	900mg	ソウジュツ乾燥エキス(ソウジュツ 600mgに相当)	60mg
	炭酸水素ナトリウム	1,200mg	炭酸水素ナトリウム	1,200mg	ホップ乾燥エキス(ホップ 700mgに相当)	50mg
	ビオチアスターゼ2000	30mg	ビオチアスターゼ2000	30mg	カンゾウエキス末(カンゾウ 980mgに相当)	140mg
					アズレンスルホン酸ナトリウム	6mg
	添加物:カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg		添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、l-メントール		添加物:無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、ハッカ油、エリスリトール、アセスルファムK	

※成分は全て1日量を記載しています。