

■エスタックイブシリーズ 成分比較表

製品名	エスタックイブファインEX			エスタックイブNT			エスタックイブTT		
カテゴリ(薬効)	かぜ薬			かぜ薬			かぜ薬		
分類	第②類医薬品			第②類医薬品			第②類医薬品		
パッケージ	<p>今すぐ治したいつらい風邪にとにかくつらい「のどの痛み・熱・せき・鼻水」などの風邪症状に、優れた効果を発揮</p> 			<p>つらい風邪の「鼻」症状に効果の高い成分を配合。ダブルの効果で、よく効く</p> 			<p>のどのつらい風邪症状へピンポイントに効果を発揮。</p> 		
剤形	錠剤			錠剤			錠剤		
効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、せき、鼻水、鼻づまり、たん、関節の痛み、筋肉の痛み、くしゃみ、悪寒、頭痛)の緩和			かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、のどの痛み、くしゃみ、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和			かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和		
用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。			次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。			次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。		
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	2錠	×服用しないこと	1回量	3錠	×服用しないこと	1回量	2錠	×服用しないこと
成分	成分 6錠(成人1日量)中			成分 9錠(成人1日量)中			成分 6錠(成人1日量)中		
	イブプロフェン	450mg		イブプロフェン	450mg		イブプロフェン	450mg	
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg		クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg		クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	
	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg		ジヒドロコデインリン酸塩	24mg		ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg		dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg		dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	
	無水カフェイン	75mg		無水カフェイン	75mg		無水カフェイン	75mg	
	ヨウ化イソプロバミド	6mg		ヨウ化イソプロバミド	6mg		グリチルリチン酸	39mg	
	アンブロキシール塩酸塩	45mg		チアミン硝酸物(ビタミンB ₁ ;硝酸塩)	24mg		酸化マグネシウム	300mg	
	酸化マグネシウム	300mg		アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg				
	添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、D-マンニトール、ステアリン酸Mg、酸化チタン、タルク、トウモロコシデンプン			添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、部分アルファー化デンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール			添加物:無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、D-マンニトール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体		

製品名	エスタックイブ		エスタックイブ顆粒			
カテゴリ(薬効)	かぜ薬		かぜ薬			
分類	第②類医薬品		第②類医薬品			
パッケージ	<p>のどの痛みや発熱によく効く 総合かぜ薬</p> 		<p>のどからきた、かぜの諸症状に ひきはじめから効く。 のみやすい顆粒剤。</p> 			
剤形	錠剤		顆粒			
効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、悪寒、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、発熱、頭痛、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和		かぜの諸症状(のどの痛み、悪寒、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、発熱、頭痛、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和			
用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。		次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。			
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	3錠	×服用しないこと	1回量	1包	×服用しないこと
成分	成分 9錠(成人1日量)中		成分 3包(成人1日量)中			
	イブプロフェン	450mg	イブプロフェン	450mg		
	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg		
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg		
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg		
	無水カフェイン	75mg	無水カフェイン	75mg		
	チアミン硝酸物(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	24mg	チアミン硝酸物(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	24mg		
	アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg	アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg		
	添加物: 無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、部分アルファー化デンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール		添加物: カルメロースCa、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、タルク、塩化Na、酒石酸、サッカリンNa、香料			

製品名	エスタックイブファイン		エスタックイブファイン顆粒			
カテゴリ(薬効)	かぜ薬		かぜ薬			
分類	第②類医薬品		第②類医薬品			
パッケージ	<p>のどの痛みやたんによく効く 総合かぜ薬</p> 		<p>のどの痛みやたんによく効く 総合かぜ薬 苦みを抑えた飲みやすい顆粒剤。</p> 			
剤形	錠剤		顆粒			
効能・効果	かぜの諸症状(発熱、悪寒、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和		かぜの諸症状(発熱、悪寒、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和			
用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。		次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。			
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	3錠	×服用しないこと	1回量	1包	×服用しないこと
成分	成分 9錠(成人1日量)中		成分 3包(成人1日量)中			
	イブプロフェン	450mg	イブプロフェン	450mg		
	アンブロキシール塩酸塩	45mg	アンブロキシール塩酸塩	45mg		
	ヨウ化イソプロバミド	6mg	ヨウ化イソプロバミド	6mg		
	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg		
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg		
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg		
	無水カフェイン	75mg	無水カフェイン	75mg		
	チアミン硝酸物(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	24mg	チアミン硝酸物(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	24mg		
	アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg	アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg		
添加物: 無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、部分アルファー化デンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール		添加物: カルメロースCa、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、酒石酸、サッカリンNa、l-メントール、ビタミンB ₂ 、香料				

*かぜの11症状

*かぜの11症状

※成分は全て1日量を記載しています。

■エスタック 家族でも使えるシリーズ 成分比較表


製品名	エスタック総合感冒				新エスタック顆粒						
カテゴリ(薬効)	かぜ薬				かぜ薬						
分類	第②類医薬品				第②類医薬品						
パッケージ	<p>5才から服用できる ファミリー向けの総合かぜ薬</p> 				<p><葛根湯加桔梗>エキスを配合した 独自処方のかぜ薬</p> 						
剤形	錠剤				顆粒						
効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、鼻水、鼻づまり、発熱、悪寒、頭痛、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和				かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和						
用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。										
	年齢	成人 (15才以上)	11~14才	5~10才	5才未満	年齢	成人(15才以上)	12~14才	12才未満		
	1回量	3錠	2錠	1錠	×服用しないこと	1回量	1包	2/3包	×服用しないこと		
成分	成分 9錠(成人1日量)中				成分 3包(成人1日量)中						
	アセトアミノフェン				900mg	葛根湯加桔梗エキス				3,000mg	
	クロルフェニラミンマレイン酸塩				7.5mg	カクコン				1.6g	
	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物				48mg	マオウ				0.8g	
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩				60mg	ケイヒ				0.6g	
	ヘスペリジン				45mg	シャクヤク				0.6g	
	カンゾウエキス(カンゾウ750mgに相当)				187.5mg	タイソウ				0.8g	
	ショウキョウ末				150mg	ショウキョウ				0.2g	
	無水カフェイン				75mg	カンゾウ				0.4g	
						キキョウ				0.8g	
						の煎液より製したエキス					
						アセトアミノフェン				720mg	
						ジヒドロコデインリン酸塩				15mg	
						クロルフェニラミンマレイン酸塩				7.5mg	
					無水カフェイン				75mg		
添加物:クロスカルメロースNa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒプロメロース、ポビドン、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、三酸化鉄								添加物:カルメロースCa、無水ケイ酸、ゼラチン、乳糖、白糖、デンプン、トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、バニリン、香料			

※成分は全て1日量を記載しています。

■エスタック ケアシリーズ 成分比較表

製品名	エスタック滋養内服液GOLD		エスタック滋養内服液VC500	
販売名	エスタック滋養液S-Ⅲ		エスタック滋養液VG	
カテゴリ(薬効)	ドリンク剤		ドリンク剤	
分類	指定医薬部外品		指定医薬部外品	
パッケージ	<p>かぜなどの発熱で、体がだるい時の栄養補給に。8種の生薬とビタミンB、タウリン配合でカフェインフリー。</p> 		<p>かぜなどの発熱で、体がだるい時の栄養補給に。5種の生薬とタウリン、ビタミンC500mg配合。</p> 	
剤形	液剤		液剤	
効能・効果	発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・栄養障害・食欲不振・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質		発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・栄養障害・食欲不振・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質	
用法・用量	成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用します。		成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用します。	
	年齢	成人(15才以上)	年齢	成人(15才以上)
	1回量	1瓶(50mL)	1回量	1瓶(50mL)
成分	成分 1瓶(成人1日量)中		成分 1瓶(成人1日量)中	
	ショウキョウエキス(ショウキョウ1,000mgに相当)	111.1mg	ショウキョウエキス(ショウキョウ450mgに相当)	50mg
	タイソウエキス(タイソウ250mgに相当)	100mg	タイソウエキス(タイソウ250mgに相当)	100mg
	シヤクヤクエキス(シヤクヤク120mgに相当)	30mg	シヤクヤクエキス(シヤクヤク120mgに相当)	12mg
	ケイヒチンキ(ケイヒ60mgに相当)	300mg	ケイヒ流エキス(ケイヒ150mgに相当)	0.15mL
	カンゾウ流エキス(カンゾウ100mgに相当)	0.1mL	カンゾウ流エキス(カンゾウ100mgに相当)	0.1mL
	タウリン	1,500mg	タウリン	1,000mg
	リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB ₂ リン酸エステル)	10mg	ビタミンB ₂ リン酸エステル	10mg
	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg	ニコチン酸アミド	60mg
	ニコチン酸アミド	60mg	アスコルビン酸ナトリウム(ビタミンCナトリウム塩)	318mg
	ローヤルゼリーチンキ(ローヤルゼリー100mgに相当)	100mg	ビタミンC	217.3mg
	トシシエキス(トシシ末300mgに相当)	33mg		
	シゴカエキス(シゴカ600mgに相当)	30mg		
	(アルコール0.4mL以下) 添加物: D-ソルビトール、白糖、アルコール、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、カラメル、香料		(アルコール0.2mL以下) 添加物: D-ソルビトール、白糖、アルコール、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、カラメル、香料	

※当製品の製造は終了いたしました。

製品名	薬用エスタックのど飴A	
販売名	エスエスのど飴Ⅲ	
カテゴリ(薬効)	口腔咽喉用剤	
分類	指定医薬部外品	
パッケージ	<p>気になるのどの炎症による不快感・痛みに効く、青リンゴ風味のドロップ剤。</p> 	
剤形	ドロップ	
効能・効果	口腔内の殺菌・消毒、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がかれ、口具の除去	
用法・用量	次の1回量を1日3~6回、かまずに口中でゆっくり溶かしてください。	
	年齢	成人(15才以上)
	1回量	2粒
成分	成分 12粒中	
	セチルピジニウム塩化物水和物	6mg
	グリチルリチン酸二カリウム	15mg
	キキョウ流エキス(キキョウ1,200mgに相当)	1,200mg
添加物: グリセリン 脂肪酸エステル、アセシルアムK、還元ビタミンE、ステビア抽出精製物、L-メントール、銀クロロフリンNa、香料、プロピレングリコール、フェニルエチルアルコール		

※当製品の製造は終了いたしました。