

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

エスファイトゴールドDX

第3類医薬品

ビタミンB₁・B₆・B₁₂ 製剤 眼精疲労、肩こり、腰痛の症状の緩和

- エスファイトゴールドDXは、筋肉や神経の機能維持に必須のビタミンB₁・B₆・B₁₂を配合し、さらに、これらの働きをバックアップするビタミンEとニコチン酸アミドの配合で、目・肩・腰のつらい症状にすぐれた効果を発揮します。
- エスファイトゴールドDXに配合されているビスベンチアミンは、ビタミンB₁を消化管からの吸収・組織への移行性にすぐれたかたちにした誘導体です。



眼精疲労に



肩こりに



腰痛に

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、軟便、下痢
- ④ 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- ⑤ 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：
眼精疲労、筋肉痛、関節痛（肩こり、腰痛、五十肩など）、神経痛、手足のしびれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」
- 次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の1回量を1日1回、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	11才~14才	5才~10才	5才未満
1回量	2~3錠	1~2錠	1錠	✕服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**成分
と
はたらき**
3錠中

成分	はたらき
ビスベンチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体) 100mg	●ビタミンB ₁ ・B ₆ ・B ₁₂ は、筋肉や神経の機能維持に必須であり、エネルギーの産生をうながしたり、神経の伝達をたすけたりすることによって、神経や筋肉の疲れからくる目・肩・腰の症状をやわらげていきます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆) 100mg	
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂) 1,500μg	
トコフェロールコハク酸 エステルカルシウム (ビタミンEコハク酸エステル カルシウム) 103.58mg (コハク酸d α -トコフェロール として100mg)	●ビタミンEは、血管を丈夫にし体のすみずみに血液をいきわたらせます。疲れがたまった筋肉や神経組織に酸素や栄養を補給する一方、老廃物の除去をうながし、ビタミンB ₁ ・B ₆ ・B ₁₂ の働きをたすけます。
ニコチン酸アミド 60mg	●ニコチン酸アミドは、ビタミンB ₁ やB ₆ などと協力し、筋肉や神経組織の活動に必要なエネルギーの産生をうながす働きがあります。

添加物：カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、D-マンニトール、アラビアゴム、カオリン、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、パレシヨデンブ、ビタミンB₂

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱ったと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

**お問い合わせ先**

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193
 受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

**エスエス製薬株式会社**〒163-1488 東京都新宿区西新宿 3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>