

本剤は1度に1箱のみ購入できます

要指導医薬品

ご使用前に必ずお読みください

アレルギー専用鼻炎薬

アレグラ[®] FXプレミアム

本剤は、花粉・ハウスダスト(室内塵)などによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状を緩和する(15才以上の)アレルギー専用鼻炎薬です。アレルギー性鼻炎による症状のうち、とくに鼻づまり症状でお困りの方が本剤をご使用ください。

- 本剤の服用は、鼻づまり症状が強い期間のみの最小限の期間にとどめ、鼻づまり症状の緩解がみられた場合には、速やかに抗ヒスタミン剤単独療法などへ、お切替えください。
- 1週間服用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談してください。また、症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師又は薬剤師に相談してください。

1 このお薬は？

日局フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリンを配合した、アレルギー専用鼻炎薬です。

販売名	アレグラ® FXプレミアム	
一般名	日局フェキソフェナジン塩酸塩	塩酸プソイドエフェドリン
含有量 (1錠中)	30mg	60mg

2 情報提供資料について

情報提供資料は、ご使用者の皆様や家族の方などに、医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。したがって、この医薬品を服用するときに特に知りたいことを、わかりやすく記載しています。
医薬品の使用による重大な副作用とみられる場合には、直ちに服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

3 このお薬の効果は？

このお薬は、アレルギーの原因となる物質(ヒスタミン)や炎症を起こす物質の作用を抑え、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのつらいアレルギー症状を改善するフェキソフェナジン塩酸塩に、鼻粘膜の充血やはれを抑え、鼻づまりを改善する塩酸プソイドエフェドリンを配合したアレルギー専用鼻炎薬(錠剤)です。

【効能・効果】

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり

4 このお薬を服用する前に、確認すべきことは？

次の項目にひとつでも該当する方は、このお薬を服用することはできません。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 15才未満の小児
- 次の症状のある人 尿閉、前立腺肥大による排尿困難
- 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病、線内障
- かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬などにより、不眠、めまい、脱力感、ふるえ、動悸を起こしたことがある人

次の項目にひとつでも該当する方は、このお薬を服用する際に注意が必要です。
服用される前に医師又は薬剤師に相談してください。

- 医師の治療を受けている人
- アレルギー性鼻炎か、かぜなど他の原因によるものかわからない人
- 気管支ぜんそく、アトピー性皮ふ炎などの他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人
- 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 高齢者
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の診断を受けた人 腎臓病

5 このお薬の使い方は？

● 服用量及び1日の服用回数

成人（15才以上）、1回2錠、1日2回朝夕の空腹時に服用してください。

年齢	成人（15才以上）	15才未満
1回量	2錠	服用しないこと
服用回数	1日2回 朝夕の空腹時	

● どのように飲むか？

コップ1杯程度の水又はぬるま湯で、嚥んだり、碎いたりせず、そのまま服用してください。

<服用する際の注意>

- ・ 定められた用法・用量を厳守してください。
- ・ アレルギー性鼻炎による症状のうち、とくに鼻づまり症状でお困りの方が本剤をご使用ください。
- ・ 本剤の服用は、鼻づまり症状が強い期間のみの最小限の期間にとどめ、鼻づまり症状の緩解がみられた場合には、速やかに抗ヒスタミン剤単独療法などへ、お切替えください。
- ・ 1週間服用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談してください。また、症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師又は薬剤師に相談してください。

<服用する際の注意>

- ・本剤の「抜け殻」が便の中に出ることがあります。これは本剤の成分が体内で吸収されたあとの残りです。成分はきちんと吸収されており、効果に影響はありませんので、ご安心ください。
- ・錠剤の取り出し方 錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押して裏面の膜を破り、錠剤を取り出して服用してください。
(誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



● 飲み忘れた場合の対応は？

- ・忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。決して2回分を一度に飲まないでください。

● 多く服用した時(過量服用時)の対応は？

- ・誤って多く飲んだ場合は、医師又は薬剤師に相談してください。

6 このお薬の服用中に気をつけなければならないことは？

● 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

- ・他のアレルギー用薬(皮ふ疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乘物酔い薬、催眠鎮静薬など)、エリスロマイシン、制酸剤(水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤)、降圧剤(メチルドパ、レセルビン)、塩酸プロソイドエフェドリン又は硫酸プロソイドエフェドリンを含有する内服薬、モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩など)

● 服用前後は飲酒しないでください。

● 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 (乳汁中への移行が認められています。)

7 副作用は？

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹、のど・まぶた・口唇などのはれ、かゆみ、じんましん、皮ふが赤くなる
消化器	はきけ、嘔吐、腹痛、消化不良、血便
精神神経系	頭痛、疲労、しびれ感、倦怠感、めまい、不眠、神経過敏、悪夢、睡眠障害、感情のたかぶり、落ち着きのなさ、脱力、恐怖、不安、緊張、ふるえ、幻覚
泌尿器	頻尿、排尿困難、尿閉
循環器	頻脈、動悸、血圧上昇、高血圧、不整脈、ショック(循環虚脱)
その他	味覚障害、浮腫、胸痛、呼吸困難、食欲不振、顔色が青白くなる、月経異常

(2) 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

□のかわき、便秘、下痢、眠気

(3) まれに起こる特にご注意いただきたい副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じ時期にあらわれることが一般的です。その場合は、医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
けいれん	筋肉の発作的な収縮があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。
無顆粒球症、白血球減少、好中球減少	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮ふの広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮ふ上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身のだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。

(4) 前記(3)の副作用の自覚症状を、症状のあらわれる部位別に並べ替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、(3)特にご注意いただきたい副作用の表などをご覧ください。

部位	自覚症状
全身	全身がだるい、発熱、突然の高熱、さむけ、筋肉の発作的な収縮
頭部	意識の混濁、意識の低下、考えがまとまらない
眼	白目が黄色くなる
口やのど	声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、のどの痛み
胸部	息苦しい、動悸
腹部	食欲不振
皮ふ	じんましん、発疹・発赤、かゆみ、皮ふが黄色くなる、赤くなった皮ふ上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る
尿	尿の色が濃くなる
その他	判断力の低下

8 このお薬に含まれているものは?

有効成分(1日量: 4錠中): 日局フェキソフェナジン塩酸塩····· 120 mg
 塩酸プロイドエフェドリン····· 240 mg

添加物:カルナウバロウ、ステアリン酸、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、
クロスカルメロースナトリウム、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸マグネシウム、
ポリビニルアルコール(部分けん化物)、酸化チタン、マクロゴール4000、タルク、
黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄

9 その他

● このお薬の保管方法は？

- ・直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

● 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

10 このお薬についての問い合わせ先は？

● 一般的な事項に関する質問はお買い求めのお店又は下記へお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室 0120-028-193

<受付時間> 9:00-17:30 (土、日、祝日を除く)

● 症状、副作用などのより詳しい質問がある場合は、医師又は薬剤師にお問い合わせください。

アレグラ®FXプレミアムは、薬剤師からの説明を受け、

説明文書をよく読み、正しくお使いください。

本剤は1度に1箱のみ購入できます。

発売元：エスエス製薬株式会社

東京都新宿区西新宿3-20-2

製造販売元：サノフィ株式会社

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

