

■ブロンシリーズ 成分比較表

厚生労働省からの通知により令和元年7月9日以降、12才未満の方はジヒドロコデインリン酸塩を配合する医薬品を使用できなくなりました。お手元の製品には12才未満の用法・用量が記載されていますが、ご使用はお控えください。

製品名	エスエスブロン液L				新ブロン液エース										
カテゴリ(薬効)	鎮咳去痰薬				鎮咳去痰薬										
分類	第2類医薬品				第②類医薬品										
パッケージ	せき・たんに良く効く、のみやすいシロップ剤。 				せき・たんに良く効く、シロップ剤。 										
剤形	シロップ				シロップ										
効能・効果	せき、たん				せき、たん										
用法・用量	次の1回量を、添付の目盛付コップではかり、いずれも1日3回食後に服用してください。なお、場合により4時間毎に1日6回まで服用することができます。														
	年齢	成人(15才以上)	11~14才	8~10才	8才未満	年齢	成人(15才以上)	12~14才	12才未満						
	1回量	5mL	3.3mL	2.5mL	×服用しないこと	1回量	10mL	6.6mL	×服用しないこと						
成分	成分 30mL中				成分 60mL中										
	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物				60mg	ジヒドロコデインリン酸塩				30mg					
	グアイフェネシン				170mg	グアイフェネシン				170mg					
	クロルフェニラミンマレイン酸塩				12mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩				12mg					
	無水カフェイン				62mg	無水カフェイン				62mg					
添加物: 果糖ブドウ糖液糖、アルコール、プロピレングリコール、塩化Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エチルパニリン、カラメル、バニリン、トメントール、香料								添加物: 果糖ブドウ糖液糖、アルコール、プロピレングリコール、塩化Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エチルパニリン、カラメル、バニリン、トメントール、香料							

製品名	新エスエスブロン錠エース				エスエスブロン錠										
カテゴリ(薬効)	鎮咳去痰薬				鎮咳去痰薬										
分類	第②類医薬品				第②類医薬品										
パッケージ	せき・たんに良く効く。去痰剤L-カルボシステインに鎮咳成分を配合した糖衣錠。 				せき・たんに良く効く。鎮咳成分を配合した糖衣錠。 										
剤形	錠剤				錠剤										
効能・効果	せき、たん				せき、たん										
用法・用量	次の1回量を1日3回食後に、水又はぬるま湯で服用してください。														
	年齢	成人(15才以上)	12才~14才	12才未満	年齢	成人(15才以上)	12~14才	12才未満							
	1回量	4錠	2錠	×服用しないこと	1回量	4錠	2錠	×服用しないこと							
成分	成分 12錠(成人1日量)中				成分 12錠(成人1日量)中										
	ジヒドロコデインリン酸塩				30mg	ジヒドロコデインリン酸塩				30mg					
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩				75mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩				50mg					
	クロルフェニラミンマレイン酸塩				12mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩				8mg					
	L-カルボシステイン				750mg	無水カフェイン				90mg					
添加物: カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ポビドン、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール								添加物: カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール							