

■ガストールシリーズ 成分比較表

製品名	ガストール錠			ガストール細粒		
カテゴリ(薬効)	胃腸薬			胃腸薬		
分類	第2類医薬品			第2類医薬品		
パッケージ	<p>つらい胃痛や胃酸逆流などによる胸やけに、出過ぎる胃酸を抑え、胃を保護する。M<sub>1</sub>ブロッカー配合の胃腸薬。</p> 			<p>つらい胃痛や胃酸逆流などによる胸やけに、出過ぎる胃酸を抑え、胃を保護する。M<sub>1</sub>ブロッカー配合の胃腸薬。</p> 		
剤形	錠剤			細粒		
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ</li> <li>胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感</li> <li>はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ</li> <li>食べ過ぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ</li> <li>胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感</li> <li>はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ</li> <li>食べ過ぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振</li> </ul>		
用法・用量	次の1回量を1日3回、毎食後に水又はぬるま湯で服用してください。			次の1回量を1日3回、毎食後に水又はぬるま湯で服用してください。		
	年齢	成人(15才以上)	15才未満	年齢	成人(15才以上)	15才未満
	1回量	3錠	×服用しないこと	1回量	1包	×服用しないこと
成分	成分 9錠(成人1日量)中			成分 3包(成人1日量)中		
	ピレンゼピン塩酸塩水和物<M <sub>1</sub> ブロッカー>(ピレンゼピン塩酸塩無水物として45mg)		47.1mg	ピレンゼピン塩酸塩水和物<M <sub>1</sub> ブロッカー>(ピレンゼピン塩酸塩無水物として45mg)		47.1mg
	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム		900mg	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム		900mg
	炭酸水素ナトリウム		1,200mg	炭酸水素ナトリウム		1,200mg
	バイオチアスターゼ2000		30mg	バイオチアスターゼ2000		30mg
添加物:カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg			添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、トメントール			

※成分は全て1日量を記載しています。